

栽培季节 红梗叶菜,又名牛皮菜、厚皮菜,为2年生蔬菜。分为春秋两季栽培,以秋季栽培为主。在山东省南部、江苏北部地区,从8月上旬-10月份均可播种,早播的当年可以采收,晚播的以春季采收为主。春播的于3月下旬-4月上旬播种,以采收幼苗为主。此外,夏季也可于6月播种,但由于气温高,应采用遮阳网栽培,8-9月上市。一般品种的播种适期为10-11月,采收期为11月-翌年5月。

选地选茬 栽培红梗叶菜宜选择地势平坦、土层深厚肥沃、土壤疏松、排灌方便的地块,前茬以浅根性作物,如有些中草药品种或禾谷类作物为好,实行四季轮作,忌重茬。

施足底肥 前茬收获后,及时翻耕晒白,要求深耕25~30厘米,并做到耙平耙细,精细平整,使土壤疏松,上虚下实。每667米²施入腐熟农家肥4000千克、复合肥料50千克作基肥。畦宽连沟2米,在土地墒情合适时,便可播种或定植。

选择良种 ① 叶甜1号(红梗)。国家蔬菜工程技术研究中心选育。红叶长柄甜菜类型,叶柄鲜红色,尤其夺目,叶片绿色,叶脉红色,叶柄较长,宽度中等,株型紧凑。耐寒,耐热,食用品质好,高产。可作为特菜栽培。② 红梗叶甜菜。北京市农业技术推广站选育。叶长卵圆形或卵圆形,叶片肥大,叶面有皱褶,鲜红或紫红色,叶缘无缺刻,叶柄断面呈“凹”字状,肥厚、肉质鲜红或紫红色。花序复总状,花白色。定植后25天

红梗叶菜 的高产 高效栽培技法

左右可陆续采收外叶,心叶继续生长,采收期长达4~6个月,667米²产量2500千克。整株有很高的观赏价值,可盆栽观赏兼食用,亦可作室外摆花。全国各地均可种植,华北、西北、东北等地区冬季可进行保护地栽培,其余季节可露地种植,长江以南地区可常年在保护地、露地栽培。

种子处理 用抗逆性强的多倍体优良品种,红梗叶菜以聚合果为播种材料,因其果皮厚,故吸收慢。播种前应将聚合果搓散,并浸种1~2天,使种子充分吸收水分以利于出苗,有条件的可用药剂处理种子,以杀灭虫卵和病菌。然后在15~20℃下催芽,待80%种子露白后,再播种。

科学播种 一般当地下3厘米处地温达5℃时即可播种。采用地膜覆盖的一般播种适期在4月上旬。小苗整株上市的采用撒播,也可条播。撒播每667米²播种量为3~5千克,播后再浅耙、踩踏一遍,使种子与泥土贴紧实,以利于萌芽。条播行距为25~30厘米,间苗后的株距为20~25厘米。一次播种多次采收的,有穴播和育苗移栽两种方式。穴播的播种宜浅不宜深,最深不超过3~4厘米,深浅一致,保证出苗整齐一致。育苗移栽播期可适当提前,需要有护根措施。育苗的每667

米²秧田用种4千克左右。育苗移栽的9月份播种,10月下旬-11月上旬定植,株行距30厘米×30厘米。

田间管护 小苗生长至2~3叶时应及时间苗,保持苗距10厘米左右,间苗后结合浇水及时追施稀粪水或0.3%尿素液,5~6叶即可采收上市。对于多次采收的栽培方式,前期管理同小苗一次性上市的肥水管理方式,5~6叶定苗后,根据苗情和土壤墒性进行肥水管理,以后每采收一次,可适量浇施稀粪水或0.3%尿素液,采收中后期,应于采收后中耕培土,促进发生新根,避免倒伏,同时做好清沟排渍、中耕及拔除杂草等工作。

采收上市 以幼苗供食的,播种后30~40天采收。以成株剥叶供食的,定植后40~60天开始采收,每次剥叶3~4片,保留3~4片大叶,宜勤收轻采。一般分期剥叶采收比采收幼苗产量高。夏播采收幼苗的,667米²产量1500~2000千克;剥叶采收的,667米²产量5000千克以上。采收的红梗叶菜应鲜嫩、叶肉厚、有光泽、无病虫害、无黄叶。剥时采收后要认真整理,挑出老黄叶、病虫害叶,然后扎成小把,放清洁水池中冲洗后,装入销售箱出售。

(程士祥)