

推介几个高产优质辣椒品种

红泽 1 号 该品种是利用鸡泽优质羊角椒和四川辣椒品种资源杂交选育成的最新品种。其特点是早熟,株高 60 厘米,株幅 55 厘米,果长 20 厘米,果肩宽 1.8 厘米,单果重 18~20 克,嫩果皮绿色,成熟果鲜红,辣味浓,含水量低,适宜鲜食和加工。植株抗病性强,耐高温,一般 667 米²产鲜椒 3 000 千克。

羊角红 1 号 该品种是河北省邯郸市羊角红辣椒研究所从鸡泽优质羊角椒选育而成。属中早熟品种,皮薄、肉厚、油多、籽香、维生素 C 含量高、辛辣适中。果长 20 厘米,果肩宽 2 厘米,单果重 20 克,形似羊角,该品种生



长势旺,连续坐果率强,抗病毒病,耐疫病,耐热性好,适应性好,一般 667 米²产 2 500 千克左右。

邯优尖辣椒 该品种是河北

省邯郸市农科所从优质鸡泽羊角椒品系选育而成,属中熟品种,椒长 15 厘米,果皮紫红色,肉厚、辣味浓、较抗病毒病、商品性好。适合春播和夏播,春播 667 米²产 2 000~2 500 千克,夏播 667 米²产 1 500~2 000 千克。

干鲜 3 号 干鲜兼用型品种,早中熟,株型开张,株高 57 厘米,株幅 68 厘米,果长 20 厘米,果肩宽 2.1 厘米,果面微皱,果形顺直,羊角形,单果重 26 克,味辣。一般 667 米²产 3 000 千克。

以上品种适宜生长气温 17~30℃,最佳生长气温 20~25℃。适合全国大部分地区种植。辣椒种植技术简单,适当增施硫酸钾及粗肥增产效果明显,盛花前期适当控制水分。

(河北省鸡泽县科协
邢银田 057350)

猝倒病 猝倒病是菠菜苗期的主要病害,子叶展开后即见病害,幼苗茎基部呈浅褐色水渍状,后发生基腐,幼苗尚未凋萎已猝倒。湿度大时,病部长出一层白色棉絮状菌丝,低温、湿度大扩展迅速。防治:可用 58%甲霜锰锌可湿性粉剂 800 倍液,或 72.2%普力克水剂 400 倍液喷雾。

心腐病 心腐病主要危害菠菜的茎基部,叶、茎、根均可受害,种子带菌的菠菜发芽后未出土就染病,出土幼苗有的心叶腐烂,有的茎基变褐、缢缩,引起猝倒,造成缺苗断垄。防治:发病初期用 36%甲基硫菌灵悬浮剂 500 倍液,或 72.2%普力克水剂 400 倍

越冬菠菜优质高产防四病

液喷雾。

霜霉病 霜霉病主要危害菠菜叶片,病斑开始呈淡黄色小点,边缘不明显,逐渐叶背病斑上产生灰白色霉层,后期变灰紫色,叶片正面呈黄斑。病斑从植株下部向上扩展。主要借助气流、雨水、农具、昆虫及农事操作传播蔓延。气温在 10℃、相对湿度 85%的低温高湿条件下发病重。防治:于发病初期用 58%甲霜锰锌可湿性粉剂 500 倍液,或 75%百菌清可

湿性粉剂 600 倍液,或 75%杜邦克露可湿性粉剂 800 倍液喷雾。

病毒病 病毒病是菠菜的一种主要病害。发病后叶片皱缩不平,叶形细小,部分心叶扭曲,新叶变黄。蚜虫、飞虱是病毒病传播的主要途径。防治:① 及时防治蚜虫,减少传播介体。② 发病初期用 1.5%植病灵乳剂 1 000 倍液,或 20%病毒 A 可湿性粉剂 500 倍液喷雾。

(任秀芝)